Prova scritta di Calcolo I. Alessandria, 15 dicembre 2006

.....
Cognome e nome

Firma

Corso di laurea

1. a. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$$

- b. Si calcoli il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)^{x^{-2}}.$$

Si discuta, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il valore del limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1)^{x^\alpha}$$

2. Si consideri la funzione definita da

$$f(x) := \frac{\log x}{x} - x + 1.$$

- Determinare il dominio di f e studiare i limiti agli estremi del dominio e determinare gli eventuali asintoti.
- Determinare gli intervalli di monotonia della f e gli eventuali minimi e massimi relativi.
- Studiare gli intervalli di convessità e di concavità di f .
- Disegnare il grafico di f .
- Disegnare il grafico di $g(x) := |f(x)|$.

3. Calcolare i seguenti integrali

$$\int \frac{x+2}{(x-1)(x^2+2)} dx, \quad \int_0^1 \sqrt{x} \sin \sqrt{x} dx.$$

Soluzioni

1. a. Si ha

$$\left| \frac{x - \sin x}{x^3} \right| \leq \frac{|x| + 1}{|x|^3}$$

e quindi per il Teorema di confronto (o dei due carabinieri) si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{x^3} = 0.$$

Usando la formula di Taylor per il seno si ha

$$x - \sin x = \frac{x^3}{6} + x^3 \omega(x),$$

dove $\lim_{x \rightarrow 0} \omega(x) = 0$. Quindi si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

Il secondo limite poteva anche essere calcolato usando il Teorema di De L'Hopital.

- b. Per le note proprietà dei logaritmi e degli esponenziali si ha

$$(x^2 + 1)^{x^{-2}} = e^{x^{-2} \log(x^2+1)}.$$

Utilizzando il limite fondamentale $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\log(y+1)}{y} = 1$ si ha $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(x^2+1)}{x^2} = 1$ e quindi

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1)^{x^{-2}} = e.$$

Analogamente a quanto appena visto si ha

$$(x^2 + 1)^{x^\alpha} = e^{x^\alpha \log(x^2+1)},$$

e quindi, scrivendo

$$x^\alpha \log(x^2 + 1) = x^{\alpha+2} \frac{\log(x^2 + 1)}{x^2}$$

si ottiene $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \log(x^2 + 1) = 0$ se $\alpha > -2$, e $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \log(x^2 + 1) = +\infty$ se $\alpha < -2$ mentre il caso $\alpha = -2$ è già stato esaminato.

Quindi il limite vale

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1)^{x^\alpha} = \begin{cases} +\infty & \alpha < -2 \\ e & \alpha = -2 \\ 1 & \alpha > -2 \end{cases}$$

2. Si consideri la funzione definita da

$$f(x) := \frac{\log x}{x} - x + 1.$$

a. Il dominio di f è $D(f) = (0, +\infty)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

e la retta $x = 0$ è asintoto verticale della funzione f .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

e la retta $y = -x + 1$ è asintoto obliquo della funzione f in $+\infty$ in quanto

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (-x + 1) = 0.$$

b. La derivata di f è

$$f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2} - 1 = \frac{1 - \log x - x^2}{x^2}.$$

Lo studio del segno di f' ci fornisce $f'(x) > 0$ per $x \in (0, 1)$, $f'(1) = 0$ e $f'(x) < 0$ per $x \in (1, +\infty)$. Quindi f è crescente in $(0, 1)$, decrescente in $(1, +\infty)$ e ha un massimo assoluto in $x = 1$. Il valore massimo assunto da f è quindi $f(1) = 0$. La funzione f non ha minimi.

c. La derivata seconda di f è

$$f''(x) = \frac{2 \log x - 3}{x^3}.$$

Quindi $f''(x) > 0$ se $x \in (e^{3/2}, +\infty)$ mentre $f''(x) < 0$ se $x \in (0, e^{3/2})$ e $f''(e^{3/2}) = 0$. La funzione f è quindi convessa in $(e^{3/2}, +\infty)$, concava in $(0, e^{3/2})$ e $e^{3/2}$ è punto di flesso.

d. Il grafico di f è rappresentato nella figura di sinistra.

e. Il grafico di g è rappresentato nella figura di destra.

3. La funzione razionale fratta si decompone nel seguente modo

$$\frac{x+2}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{1}{x^2+2} + \frac{3}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{1}{x^2+2} + \frac{1}{x-1} - \frac{x}{x^2+2}.$$

Siccome

$$\int \frac{1}{x^2+2} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(x/\sqrt{2}) + c,$$

$$\int \frac{1}{x-1} dx = \log|x-1| + c,$$

$$\int \frac{x}{x^2+2} dx = \frac{1}{2} \log(x^2+2) + c$$

si ottiene

$$\int \frac{x+2}{(x-1)(x^2+2)} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(x/\sqrt{2}) + \log|x-1| - \frac{1}{2} \log(x^2+2) + c.$$

Nel secondo integrale si può fare la sostituzione $t = \sqrt{x}$ e si è ricondotti al calcolo dell'integrale

$$\int_0^1 \sqrt{x} \sin \sqrt{x} dx = \int_0^1 2t^2 \sin t dt.$$

Integrando per parti si ottiene

$$\int_0^1 2t^2 \sin t dt = \int_0^1 4t \cos t dt - 2t^2 \cos t \Big|_0^1.$$

Integrando ancora per parti

$$\int_0^1 4t \cos t \, dt = - \int_0^1 4 \sin t \, dt + 4t \sin t \Big|_0^1 = 4 \cos t \Big|_0^1 + 4t \sin t \Big|_0^1.$$

In definitiva si ottiene

$$\int_0^1 2t^2 \sin t \, dt = 4 \cos t \Big|_0^1 + 4t \sin t \Big|_0^1 - 2t^2 \cos t \Big|_0^1 = 4 \sin 1 + 2 \cos 1 - 4.$$