- Istruzioni. 1. Compilare la parte soprastante, scrivendo in STAMPATELLO sopra la riga punteggiata.
 2. Consegnare ANCHE questo foglio.
 3. PROIBITO usare libri, quaderni, calcolatori.
 4. Tempo a disposizione: 120 min.

1. Data la funzione

$$\frac{xy + \sin(xy)}{x^2 + y^2} + \sqrt{1 - x - y},$$

determinarne il campo di esistenza e rappresentarlo in modo COMPENSIBILE nel piano cartesiano x, y ;
 determinare il limite per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

2. Data la funzione

$$f(x, y) = \log(1 + x(x - y)),$$

- a) determinarne il campo di esistenza e rappresentarlo in modo COMPENSIBILE nel piano cartesiano x, y ; b) calcolare le derivate parziali del primo e secondo ordine e trovare i punti critici;
 c) determinare gli insiemi di livello e rappresentarli nel piano cartesiano x, y .

3. Dimostrare la convergenza e quindi calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3^{n-1}}{n!}.$$

4. Data la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(nx)^n}{(n+1)!}$, stabilire se converge o no, al variare di $x \in \mathbf{R}$, $x \geq 0$, $x \neq 1/e$.

5. Data la forma differenziale

$$\omega = \left(\frac{x + y\sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right) dx + \left(\frac{y + x\sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \right) dy,$$

- (a) discuterne l'esattezza e in caso positivo trovare una primitiva;
 (b) calcolare

$$\int_{\phi} \omega, \quad \text{dove} \quad \phi(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos t \\ \frac{1}{2} \sin t \end{pmatrix}, \quad t \in [0, \pi];$$

- (c) dedurre il valore dell'integrale

$$\int_{\psi} \omega, \quad \text{dove} \quad \psi(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cos t \\ \frac{1}{2} \sin t \end{pmatrix}, \quad t \in [\pi, 2\pi],$$

senza calcolarlo direttamente.

1. Le condizioni da imporre sono $x^2 + y^2 \neq 0$ e $1 - x - y \geq 0$, che è vera al di sotto della retta $y = 1 - x$, esclusa l'origine. Il limite non esiste, perché le restrizioni lungo gli assi tendono a 1, mentre quella lungo la retta $y = x$ tende a 2.

2. a) La funzione f è definita per le coppie (x, y) tali che $1 + x^2 - xy > 0$, quindi il campo di esistenza è dato da $D = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x > 0, y < x + 1/x\} \cup \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x < 0, y > x + 1/x\} \cup \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x = 0\}$.
 b) Le derivate parziali prime e seconde sono date da

$$f_x = \frac{2x - y}{1 + x^2 - xy}, \quad f_y = \frac{-x}{1 + x^2 - xy},$$

$$f_{xx} = \frac{2 - 2x^2 + 2xy - y^2}{(1 + x^2 - xy)^2}, \quad f_{yy} = \frac{-x^2}{(1 + x^2 - xy)^2}, \quad f_{xy} = \frac{x^2 - 1}{(1 + x^2 - xy)^2}.$$

Vi è un unico punto critico (cioè in cui le derivate parziali prime sono entrambe nulle), le cui coordinate risolvono il sistema

$$\begin{cases} \frac{2x - y}{1 + x^2 - xy} = 0 \\ \frac{-x}{1 + x^2 - xy} = 0 \end{cases}$$

e si tratta ovviamente dell'origine.

c) Dato $k \in \mathbf{R}$, l'insieme di livello k è costituito dai punti $(x, y) \in CE(g)$ tali che $g(x, y) = k$, ossia $1 + x^2 - xy = e^k$, da cui l'alternativa

$$\begin{cases} \text{se } x = 0, \text{ allora } k = 0 \text{ per ogni } y; \\ \text{se } x \neq 0, \text{ allora } y = x + \frac{1 - e^k}{x}. \end{cases}$$

Nella figura sono riportate le linee di livello (la riga continua corrisponde al caso $k > 0$, quella tratteggiata al caso $k < 0$; se $k = 0$ si trova la bisettrice $y = x$ e, come detto nella prima alternativa, l'asse $x = 0$).

3. Si tratta di una serie esponenziale (quindi convergente), che parte da $n = 2$, dunque la somma vale

$$\frac{1}{3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} - 1 - 3 \right) = \frac{e^3 - 4}{3}$$

4. La serie è a termini non negativi, anzi strettamente positivi non appena $x > 0$ (il caso $x = 0$ è banale): applicando il criterio del rapporto, occorre calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{n+1}}{x^n} \frac{(n+1)!}{n^n} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x \frac{n+1}{n+2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = e x$$

(l'ultima uguaglianza scende dal fatto che $[1 + 1/n]^n$ tende a e). Dunque, la serie converge se $e x < 1$, ossia $x < 1/e$, diverge se $x > 1/e$.

5. (a) Il campo di esistenza D di ω è l'interno del cerchio unitario di centro l'origine, che è un insieme aperto e stellato, inoltre ω è chiusa, quindi è anche esatta in D . Determiniamo una primitiva F in D : scelto come punto di partenza dell'integrale curvilineo il punto $(0, 0)$, se (x, y) è un punto di D avremo che $F(x, y)$ è data dall'integrale di ω lungo la curva ottenuta saldando il segmento che congiunge $(0, 0)$ a $(x, 0)$ con il segmento che congiunge $(x, 0)$ a (x, y) . I due segmenti in questione hanno nell'ordine le seguenti rappresentazioni

$$\begin{pmatrix} tx \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 1] \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} x \\ ty \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 1]$$

pertanto si ha

$$F(x, y) = \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1 - t^2 x^2}} x dt + \int_0^1 \frac{ty + x\sqrt{1 - x^2 - t^2 y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - t^2 y^2}} y dt =$$

$$= -\left[\sqrt{1 - t^2 x^2} \right]_0^1 - \left[\sqrt{1 - x^2 - t^2 y^2} \right]_0^1 + \left[xyt \right]_0^1 = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} + xy + 1.$$

Tutte le altre primitive in D sono date da $F + k$, al variare di $k \in \mathbf{R}$.

(b) L'integrale curvilineo richiesto lungo ϕ si calcola come segue:

$$\begin{aligned}\int_{\phi} \omega &= \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \frac{\cos t + (\sqrt{3}/2) \sin t}{\sqrt{3}/2} \left(-\frac{1}{2} \sin t\right) dt + \int_{\phi} \omega = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \frac{\sin t + (\sqrt{3}/2) \cos t}{\sqrt{3}/2} \left(\frac{1}{2} \cos t\right) dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[-\int_0^{\pi} \left(\sin t \cos t + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin^2 t\right) dt + \int_0^{\pi} \left(\sin t \cos t + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos^2 t\right) dt \right] = \frac{1}{4} \int_0^{\pi} \cos(2t) dt = 0\end{aligned}$$

(c) La curva ϕ descrive la semicirconferenza superiore di centro l'origine e raggio $1/2$, percorsa in senso antiorario; la curva ψ descrive la semicirconferenza inferiore, percorsa nello stesso senso. Poiché la forma è esatta, l'integrale lungo $\phi + \psi$ deve valere 0, quindi l'integrale lungo ψ è l'opposto di quello lungo ϕ . Per quanto visto nel punto (b), l'integrale lungo ψ vale dunque 0.