

**NIDIFICAZIONE DI CIVETTA NANA, *Glaucidium passerinum*,
SULLE ALPI PIEMONTESI**

ABSTRACT. — *Nesting of Glaucidium passerinum on the Piedmont Alps (NW Italy).*

La Civetta nana è una specie estremamente rara nelle Alpi occidentali, dove raggiunge il limite SW dell'areale riproduttivo. La sua nidificazione, sul versante italiano, non era ancora stata accertata; solo recentemente si sono registrate le prime osservazioni di probabile nidificazione della specie in Valle d'Aosta e in Piemonte (CUCCO & MINGOZZI 1988). Anche sul versante francese la Civetta nana è rarissima (LEBRETON 1977) o inosservata fino all'inizio degli anni '80 (CROCQ 1984; MISIEK 1986).

Nel giugno 1989 se ne è definitivamente accertata la riproduzione, in una valletta laterale della Val Chisone (prov. Torino), in una località a 1500 m di quota. Il nido era situata su un grande larice, in una cavità scavata dal Picchio rosso maggiore, *Picoides major*, a circa 6 m dal suolo. Il foro, rivolto verso N, fa parte di una serie di 10 buchi situati tra i 4 e i 15 m. L'ambiente circostante è costituito in maggior parte da Abeti bianchi di alto fusto, con rari Larici e Faggi.

La nostra prima osservazione della Civetta nana nella zona risale al 10 dicembre 1983, quando la specie fu rintracciata in seguito a stimolazione acustica con magnetofono. Specifiche ricerche effettuate in seguito confermarono in tutti gli anni seguenti la presenza della specie nella zona, ma non ne provarono la nidificazione. Nel 1989 sono state effettuate le seguenti osservazioni:

- identificato un soggetto in canto serale nel bosco, a circa 800 m dal futuro nido, nei giorni 6 e 13 gennaio, 4 e 17 maggio 1989;
- il 24.5.89 vengono trovate diverse borre e un frammento del guscio di un uovo alla base del larice; una Civetta nana entra nella cavità;
- il 1° giugno vengono raccolte nuove borre alla base della cavità e la sera del 14.6.89 osserviamo contemporaneamente 2 adulti con prede (micro-mammiferi) su rami di abeti bianchi e un giovane affacciato al foro esterno del nido;
- il 17 giugno il nido è vuoto.

Il periodo di deposizione delle uova, avvenuto nella seconda quindicina di aprile (calcolando 28-30 giorni di incubazione e 27-34 giorni di allevamento al nido (CRAMP 1985), è simile a quello dell'areale centroeuropeo.

BIBLIOGRAFIA

- CRAMP S. (ed.), 1985 - The Birds of the Western Palearctic, Vol. IV - *Oxford University Press*.
- CROCQ C., 1984 - La Chouette chevêchette (*Glaucidium passerinum* (L.)) dans les Alpes française du Sud: notes sur l'élevage du jeunes après l'envol - *Alauda*, 52: 241-247.
- CUCCO M. & MINGOZZI T., 1988 - Civetta nana *Glaucidium passerinum*. In: MINGOZZI T., BOANO G. & PULCHER C. - Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta - *Museo reg. Scienze nat.*, Torino.
- LEBRETON PH. (red.), 1977 - Atlas ornithologique Rhône-Alpes - *Centre Ornith. Rhône-Alpes*, Lyon.
- MISIEK P., 1986 - La Chouette chevêchette *Glaucidium passerinum* dans les Alpes-Maritimes - *Alauda*, 54: 147-148.

PIERANGELO GENTILE (*), LILIANA BELTRAMINO (*) & MARCO CUCCO (**)

(*) *G.P.S.O. Museo St. Nat. Carmagnola, Casc. Vigna, 10022 Carmagnola (TO)*.

(**) *Dip. Biol. Animale, Univ. Torino, Via Acc. Albertina 17, 10123 Torino*.